

Vaccination,  
où en êtes-vous ?

# Le calendrier vaccinal simplifié 2011

	NAISSANCE	2 MOIS	3 MOIS	4 MOIS	12 MOIS	16-18 MOIS	24 MOIS	6 ANS	11-13 ANS	14 ANS	16-18 ANS	26-28 ANS	36-64 ANS	+65 ANS
■ BCG	●													
■ DIPHTÉRIE/TÉTANOS/POLIOMYÉLITE		●	●	●		●		●	●		●	●	●	●
■ COQUELUCHE		●	●	●		●			●			●		
■ HIB [Haemophilus influenzae de type B]		●	●	●		●								
■ HÉPATITE B		●	■			●								
■ PNEUMOCOQUE		●		●	●	■								
■ MÉNINGOCOQUE de type C				●	■									
■ ROUGEOLE/OREILLONS/RUBÉOLE					●	■								
■ PAPILLOMAVIRUS HUMAIN [HPV]										●				
■ GRIPPE														●

## Où se vacciner ?

Chez votre médecin traitant

Chez une infirmière sur prescription

Dans un centre de vaccinations public :

• à Marseille :  
23 rue Louis Astruc,  
5<sup>e</sup> arrondissement

• hors Marseille :  
voir liste des centres  
sur le site :

<http://www.cg13.fr/solidarites/sante/centres-de-vaccination.html>

Pour acquérir une immunité de base, plusieurs injections sont souvent nécessaires (par exemple, trois injections à un mois d'intervalle avec rappel un an après). Ensuite, pour maintenir une protection suffisante et durable, l'immunité doit être entretenue par des rappels réguliers définis dans le calendrier vaccinal.

**Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation d'un programme de vaccination, il n'est pas nécessaire de le recommencer.**

**Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en fonction de l'âge et du nombre de doses de vaccin manquantes.**

### VACCINATION DANS CERTAINES CONDITIONS

#### BCG

Dès la naissance chez tous les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose (notamment tous les enfants résidant en Ile-de-France et en Guyane). Elle peut être proposée jusqu'à 15 ans chez les enfants à risque élevé non encore vaccinés.

#### DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

Un rappel tous les 10 ans après celui réalisé entre 16 et 18 ans.

#### COQUELUCHE

Une dose de vaccin contenant la composante « coqueluche » est recommandée une seule fois chez les adultes n'ayant pas été vaccinés dans les dix années précédentes, en particulier chez les futurs parents et les personnels soignants.

#### HÉPATITE B

La vaccination débute dès le jour de la naissance (si la mère de l'enfant est infectée par l'hépatite B), et pour tous les autres enfants à partir de l'âge de 2 mois. Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la première année de vie, elle peut être réalisée en rattrapage pour les enfants et adolescents jusqu'à 15 ans. A partir de 16 ans, elle est recommandée chez les personnes à risque.

#### PNEUMOCOQUE

La vaccination est recommandée pour tous les nourrissons à 2, 4 et 12 mois. Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque, une dose supplémentaire est nécessaire à 3 mois. Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée pour les enfants et les adultes à risque.

#### MÉNINGOCOQUE DE TYPE C

La vaccination est recommandée avec une dose pour tous les enfants de 12 à 24 mois et en rattrapage chez les personnes de 2 à 24 ans.

#### ROUGEOLE / OREILLONS / RUBÉOLE

La vaccination est recommandée pour tous les enfants âgés de 12 mois avec une deuxième dose entre 13 (au plus tôt) et 24 mois (au plus tard) et dès l'âge de 9 mois pour les enfants vivant en collectivité (dans ce cas, la deuxième dose est recommandée entre 12 et 15 mois).

Les personnes nées à partir de 1980 devraient avoir reçu au total deux doses de vaccins.

#### PAPILLOMAVIRUS

La vaccination est recommandée à toutes les jeunes filles de 14 ans, avant exposition au risque d'infection. Un rattrapage est possible entre 15 et 23 ans pour les femmes qui n'ont pas eu de rapports sexuels ou au cours de l'année qui suit le début de leur vie sexuelle.

#### GRIPPE

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année à partir de l'âge de six mois pour les personnes à risque et pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.

*D'après l'INPES*

Plus que jamais, Marseille !

